

کاندیدهای مناسب برای تخلیه ژل لب چه کسانی هستند؟

لب ها یکی از عناصر اصلی در زیبایی چهره ما هستند؛ به همین دلیل تزریق ژل لب یکی از اقدامات محبوب در حوزه زیبایی است. گاهی به دلیل عدم مهارت و تجربه کافی پزشک در تزریق، عوارضی به وجود می آید که فرد را مجبور به تخلیه ژل لب می کند. در ادامه می خواهیم شما را با دلایل و روش ها و مراقبت های بعد از تخلیه ژل آشنا کنیم.



MEDVİKA

زیبایی یک انتخاب است، با ما بهترین ها را تجربه کنید

ساعت پاسخگویی: ۹ تا ۲۰

www.medvika.com ☎ **۰۹۳۸۶۰۶۹۰۷۵**

برای دریافت مشاوره رایگان و رزرو نوبت روی بنر کلیک کنید.

دلایل تخلیه ژل لب چیست؟

تخلیه ژل لب هنگامی انجام می شود که شخص از نتیجه تزریق ژل ناراضی باشد. علت تخلیه ژل همیشه به دلایل زیبایی نیست و گاهی جنبه پزشکی دارد. اگر **تزریق ژل در مشهد** توسط افراد غیر متخصص و بی تجربه انجام شود؛ می تواند عوارض و مشکلات جدی را برای فرد به وجود بیاورد. در ادامه به بررسی علت های آن می پردازیم:

1. تزریق نامتقارن ژل لب

تزریق نامتقارن باعث بد حالت شدن و تغییر فرم لب ها می شود. برای اصلاح این وضعیت می توان از تزریق اصلاحی جهت قرینه سازی لب ها استفاده کرد اما برخی افراد تخلیه ژل را ترجیح می دهند.

2. آلودگی ژل لب

در صورت استفاده از ژل های آلوده، عفونت در پوست ایجاد می شود. برای رفع این مشکل مصرف یک دوره آنتی بیوتیک تجویز می شود. اما در صورت گسترش عفونت، ژل لب باید توسط «هیپالورونیداز» خارج شود.

3. تزریق بیش از حد ژل

یکی از مهم ترین دلایل تخلیه ژل، تزریق بیش از حد و غیر معمول ژل است. تزریق بیش از اندازه، جلوه ای غیر طبیعی و ناخوشایند به لب ها می دهد و باعث تغییر فرم لب ها به صورت غیر عادی می شود.

4. ایجاد توده در لب ها

در بعضی از افراد پس از تزریق، توده ها و برآمدگی هایی بر روی لب ها ایجاد می شود. این توده ها معمولاً بعد از گذشت چند هفته از بین می روند؛ اما اگر روند بهبود طولانی شود، با مراجعه به پزشک باید اقدام به اصلاح یا تخلیه ژل لب کرد.



بعد از تزریق احتمال ایجاد توده در لب ها وجود دارد که بعد از مدتی رفع می شود.

5. تاثیرات تیندال

این عارضه به ندرت اتفاق می افتد، اما در صورت بروز، نیاز به تخلیه ژل وجود دارد. به دلیل شفافیت فیلرهای پوستی، انعکاس نور از آن ها آبی رنگ به نظر می رسد. تیندال باعث آبی دیده شدن بخش هایی از لب که تزریق در آن انجام گرفته می شود.

6. انسداد جریان خون

تزریق ژل در نزدیکی شریان ها و عروق خونی باعث انسداد جریان خون می شود. این موضوع نیز باعث ایجاد لک های سفید بر روی پوست می گردد. در صورت بروز این مشکل حتما باید اقدام به تخلیه ژل لب کرد.

روش های تخلیه ژل لب

ژل لب بعد از گذشت مدتی به طور طبیعی جذب می شود، اما در مواردی بایستی تخلیه شود. بسته به نوع فیلر یا ژل و شدت ناهنجاری، روش های مختلفی برای تخلیه ژل لب وجود دارد که در ادامه آن ها را معرفی می کنیم.

1. تخلیه ژل لب با سوزن

برای ژل هایی با غلظت کم مانند هیالورونیک اسید می توان از تخلیه ژل لب با سوزن استفاده کرد. پزشک به کمک یک سوزن نازک مواد را به راحتی از بافت لب خارج می کند. در این روش امکان ایجاد کیست های کوچک بر روی لب وجود دارد که پس از مدتی از بین می روند.

2. تخلیه ژل لب با جراحی

انجام روش های ذکر شده در بالا تنها برای تخلیه ژل های با غلظت کم مفید است. ژل های با دوام سیلکونی به کمک روش های معمول و آنزیم خارج نمی شوند. در چنین مواردی با کمک بی حسی های موضعی و ابزار جراحی لب برش خورده و فیلر از آن خارج می شود. بخیه های جراحی بعد از گذشت مدتی بهبود می یابند.



ژل های بادوام به کمک جراحی از لب ها خارج می شوند.

3. تخلیه ژل با تزریق آنزیم

برای حل و تخلیه ژل می توان از ماده ای به نام «هیالورونیداز» استفاده کرد. پزشک به وسیله یک سوزن نازک این آنزیم را به ناحیه ای که نیاز به تخلیه دارد، تزریق می کند. این آنزیم باعث تجزیه ژل، از بین رفتن آن و بازگشت ناحیه درمان به حالت اولیه می شود. با اینکه هیالورونیداز با بدن سازگاری دارد، اما قبل از انجام تزریق، حتماً تست حساسیت انجام دهید.

4. تخلیه ژل لب به کمک سونوگرافی

در صورت بروز عارضه بعد از تزریق ژل لب، از روش سونوگرافی استفاده می شود. اگر توده و کیست های روی لب سفت باشند؛ برای از بین بردن آن ها باید از تیغ جراحی استفاده کرد. به کمک سونوگرافی می توان نتیجه گرفت که کدام روش برای تخلیه توده ها مناسب است.

مراقبت های پیش از درمان

1. صورت خود را از آرایش پاک کنید و سپس با یک شوینده شسته و خشک کنید.
2. از یک هفته قبل از درمان از مصرف داروهای غیر ضروری مانند: ویتامین C، امگا3، مکمل های غذایی، آسپرین و غیره خودداری کنید.
3. در صورت وجود هرگونه زخم یا آکنه و عفونت از تخلیه ژل لب اجتناب کنید.
4. قبل از تخلیه با آنزیم حتماً تست حساسیت دهید.

مراقبت های بعد از درمان

تخلیه ژل نیاز به مراقبت های خاصی ندارد اما بهتر است چند نکته مراقبتی را برای نتیجه بهتر رعایت کنید.

1. تا 2 روز بعد از خارج کردن ژل لب از مصرف آسپرین خودداری کنید.
2. در صورت بروز هرگونه علائم پیش بینی نشده حتماً به پزشک مراجعه کنید.
3. برای کاهش التهاب و درد می‌توانید از کمپرس آب سرد استفاده کنید.
4. تا 2 هفته از مصرف دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی اجتناب کنید.
5. تا 24 ساعت بعد از تخلیه ژل از مواد آرایشی و بهداشتی استفاده نکنید.
6. تا 2 هفته در معرض آفتاب قرار نگیرید.

عوارض احتمالی تخلیه ژل

بعد از تخلیه ژل احتمال تورم، التهاب و خون‌مردگی موقتی وجود دارد که بعد از گذشت مدتی بهبود می‌یابد. بروز آلرژی در ناحیه تزریق آنزیم به ندرت اتفاق می‌افتد. بروز این عارضه بیمار را در خطر «آنافیلاکسی» (نوعی واکنش آلرژیک) قرار می‌دهد و بیشتر در افرادی که به نیش زنبور حساسیت دارند اتفاق می‌افتد. تخمین دز مناسب برای تجزیه ژل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تزریق بیش از نیاز، باعث آسیب به پوست و بافت لب‌ها می‌شود. علاوه بر این عدم تزریق دوز کافی نیز باعث طولانی شدن پروسه درمان و نیاز به تعداد جلسات بیشتر می‌شود.



یکی از عوارض تخلیه ژل لب، کبودی لب‌ها است.

آیا تخلیه ژل لب در خانه امکان‌پذیر است؟

اگر از نتیجه تزریق ژل لب خود ناراضی هستید، بهترین کار مراجعه به پزشک و بررسی بهترین روش تخلیه است. استفاده از روش‌های غیر اصولی و تخلیه ژل در خانه می‌تواند به زیبایی لب‌های شما صدمه بزند. اگر تخلیه ژل لب برایتان مقدور نیست؛ بهتر است صبر کنید تا ژل جذب شود. تنها روش خانگی تخلیه ژل، ماساژ لب‌ها است. البته فراموش نکنید که ماساژ باید توسط پزشک به شما آموزش داده شود. ماساژ، لب‌ژل را از بین نمی‌برد و تنها می‌توان از آن برای قرینه‌سازی و فرم‌دهی به لب‌ها استفاده کرد.

بهترین مرکز تزریق ژل لب در مشهد

حالا که با دلایل و روش های اصولی تخلیه ژل لب آشنا شدید؛ می دانید که انتخاب یک پزشک متخصص و ماهر از اهمیت بالایی در رسیدن به نتیجه مطلوب برخوردار است.

مدویکا، سامانه آنلاین معرفی بهترین پزشکان و کلینیک های زیبایی در مشهد، کلینیک سلامت ایده آل را به عنوان بهترین مرکز زیبایی تزریق ژل به شما عزیزان معرفی می کند. برای رزرو وقت و مشاوره رایگان می توانید با شماره های [05136166](tel:05136166) یا [09386069075](tel:09386069075) تماس بگیرید.

پر تکرار ترین سوالات در مورد تخلیه ژل

1. چه مدت بعد از تخلیه ژل لب می توان دوباره تزریق انجام داد؟

هیچ محدودیتی برای تزریق ژل بعد از تخلیه وجود ندارد؛ اما بهتر است اجازه دهید دوران نقاهت بعد از تخلیه ژل تمام شود و بعد اقدام به تزریق کنید.

2. آیا تخلیه ژل لب در یک جلسه انجام می شود؟

تعداد جلسات تخلیه ژل بسته به حجم ژل و روش و مهارت پزشک متفاوت است. گاهی اوقات به بیش از یک جلسه احتیاج است.

3. هزینه تخلیه ژل لب چقدر است؟

بسته به روش انتخابی شما و تعداد جلسات، هزینه متفاوت است